

項目	チェックポイント	○:可 ×:不可
1.処置前の手指衛生	1-1) 手袋着用の前に手指衛生をしていますか	
2.個人防護具(PPE)の着用	2-1) PPEは施設で決められている順番で着けていますか (例:エプロン⇒マスク⇒ゴーグル⇒手袋 手袋を最後に着ける)	
	2-2) エプロン(もしくはガウン)をつけていますか	
	2-3) ゴーグル(もしくはフェースシールド)をつけていますか	
	2-4) マスクをつけていますか	
	2-5) 手袋をつけていますか	
3.気管吸引で感染リスクになりやすいポイント	3-1) 気管吸引の前には、口腔または鼻腔を介して咽頭部に貯留した唾液などをあらかじめ吸引していますか 推奨されること:気管カニューレにカフ上部吸引ポートが付いている場合には、カフ上部に貯留した分泌物も吸引除去する。	
	3-2) 洗浄水(気管吸引終了後に、吸引カテーテルから吸引瓶までの接続チューブを洗浄、通水する目的でのみ使用する)は適宜交換していますか 推奨されること:洗浄水についてはその都度残液は廃棄する。	
	3-3) 閉鎖式吸引の場合、生理食塩水(カテーテル内の分泌物を洗浄する目的で使用)は施設で決められた頻度で交換していますか 推奨されること:単回使用の専用生食水を使用し、その都度交換する。もしくはシリンジに生食水を準備し最低1回/日は交換する。	
	3-4) 開放式吸引カテーテルは、1回ごとに破棄していますか 推奨されること:滅菌された製品を1回ごとに破棄する	
	3-5) 閉鎖式吸引カテーテルは、メーカーが推奨する交換時期もしくは施設で決めている交換時期を遵守していますか	
	3-6) 用手換気装置(バッグバルブマスクやジャクソンリース等)は未処理のまま患者間で使用していませんか 推奨されること:違う患者に使用する場合は、高レベル消毒もしくは滅菌処理をする 洗浄・高レベル消毒もしくは滅菌後は清潔な袋等に入れて保管する	
4.個人防護具(PPE)の廃棄	4-1) PPEは施設で決められている順番で外していますか (例:手袋⇒ゴーグル⇒エプロン⇒マスク 脱ぐ時は手袋を先に脱ぐ)	
	4-2) 次の患者ケアに移る前に使用した個人防護具(エプロン・手袋)を施設規定の廃棄容器に廃棄していますか	
5.処置後の手指衛生	5-1) 個人防護具を処理した後に手指衛生をしていますか	

<参考文献>



- 1) 竹股喜代子編集. 看護場面における感染防止. 日本看護教育委員会. 2007
- 2) 廣瀬千也子監修. 感染管理QUESTION BOOK3. 感染防止と看護ケア. 中山書店. 2005
- 3) 気管吸引ガイドライン(改訂第1版). 日本呼吸療法医学会 気管吸引ガイドライン改訂ワーキンググループ. 2012